

Darras Isabelle

Concerne : rapport Denver Hem Sojo Z Elevage Sojo
Notre référence : 325587 - 11/02/2025

België

Cher collègue,

Merci pour la référence, voici les résultats de nos recherches.:

Client

Nom : Elevage Sojo Virginie Cazin-Delbende
Adresse : 530 Rue Blanche
Ville : 62890 Tournehem Sur La Hem
Pays : Frankrijk

Téléphone :
GSM 1 : 0618/72.38.38
GSM 2 :

Patient

Nom : Denver Hem Sojo Z
Race : Zangersheide
Sexe : MN

Date de naissance : 16/06/2023
Identification : 25000123710836b
Passeport : 250259600670401

Diagnostic : Cryptorch

Anamnèse : Demande d'examen et de traitement d'un étalon cryptorchide.
En plus, demande de screening radiographique pieds et OCD.

Clinique : Condition générale: très bonne.
Examen pré-anesthésique: normal.

Examen statique:
- testicule gauche dans le scrotum.
- testicule droit dans le canal inguinal (confirmé avec ultrasonographie).

Examen radiographique/screening OCD:
- boulet MPG: petit fragment sur le bord proximodorsal, côté médial de la première phalange.

Tx:
- castration ouverte.
- arthroscopie du boulet MPG, face dorsale:
Bonne veuil assisté sans complications.

Décision : Cryptorchide inguinale droite.
Castration.
OCF boulet MPG.

Pronostic comme cheval de sport: bon.

Thérapie : Médicaments : 20 ml de Emdocam po une fois par jour pendant 6 jours et 3 cuillères à soupe d'emdotrim deux fois par jour pendant 8 jours.

Bandage :
- Pansement pendant 3 semaines, à changer tous les 7 jours. Pansement du bord de la couronne jusqu'au metacarpe proximal.
- Après 2 semaines, les sutures doivent être enlevées de manière stérile (après un lavage à la bétadine ou à l'hibitane), puis le pansement doit être refait pendant 1 semaine.

Revalidation:

- Repos au box pendant 3 semaines, puis travail au pas. Le cheval est autorisé à sortir du box pour se rendre à l'aire de pansage. Gardez les bandages secs.
- 3 semaines après l'opération, le cheval peut être promené à la main. Commencez par 10 minutes de marche par jour. Au cours des semaines suivantes, le temps de marche peut être progressivement augmenté jusqu'à 20-30 minutes.
- 4 semaines après l'opération : le cheval peut se déplacer librement dans un petit paddock/pâturage de 10 m sur 10 m.
- 6 semaines après l'opération, le cheval peut être autorisé à se rendre dans le grand pâturage et un travail léger peut être repris.

Conduite à tenir pour la castration:

Maintenez la plaie de castration aussi propre que possible. En cas de souillure, nettoyez-la avec du savon à base de bétadine et d'hibitane. Maintenez l'étable propre.

Si la plaie de castration gonfle, le drainage normal peut être perturbé. Dans ce cas, contactez votre vétérinaire. La plaie cutanée/la plaie de castration doit ensuite être ouverte de manière STÉRILE.

Normalement, la plaie est refermée après environ 4 semaines.

Cordialement,

Bernard Boussauw
Diplomate ECVS
European Specialist Equine Surgery